



วงจรชีวิตของสุนัขและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า



หยุดโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

5 ข

วงจรชีวิตของสุนัขและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า



ข้อสังเกตและระยะเวลา

ข้อควรปฏิบัติ

สุนัขกัดสัปดาห์



- อยู่ห่างจากสุนัขจรจัดที่วิ่งอยู่ เนื่องจากส่งสุนัขตัวเมีย
- ไม่ควรนำสุนัขไปบ้านของตนตาม และอาจติดเชื้อหากกัดหรือเลีย

ตั้งท้อง



- วางแผนทำหมัน เมื่อแม่สุนัขคลอดแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

ออกลูก



- ในขณะคลอดลูกสุนัขควรได้รับวัคซีน 2 ครั้ง และหลังจากนั้น 1 ครั้ง
- ระวังสุนัขเลียจุดอ่อนจุดจุดของลูกสุนัข
- ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

ลูกสุนัขเริ่มมีอาการ



- อาการเริ่มแรกคือ กัดเท้าตัวเอง
- อาการเริ่มแรกคือ กัดเท้าตัวเอง
- อาการเริ่มแรกคือ กัดเท้าตัวเอง
- อาการเริ่มแรกคือ กัดเท้าตัวเอง

4 เดือน

### หยุดโรคพิษสุนัขบ้าด้วย 5 ข.

- อย่าเหยย**  
หากเล่นกับสัตว์เลี้ยงให้สุนัขไม่เห่ หรือหงุดหงิด
- อย่าเหยียบ**  
อย่าเหยียบหาง ขาหลัง หรือเท้าสุนัขเด็ดขาด
- อย่าแยก**  
หากมีสัตว์เลี้ยงกำลังกัดกัน ห้ามแยกตัวเด็ดขาด
- อย่าหยิบ**  
หยิบเคลื่อนย้าย ขามอาหาร ขณะที่มีสัตว์เลี้ยงกำลังกิน
- อย่ายุ่ง**  
หรือเล่นกับสุนัขแมว สัตว์เลี้ยงนอกบ้านหรือที่ไมทราบประวัติ

# โรคพิษสุนัขบ้า


สำนักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
150 หมู่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โทร.032-818160  
Website: www.kamnoednoppakhun.go.th





โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (Rabies, Hydrophobia) หรือในภาษาอีสานเรียกว่า "โรคหมาว้อ" เป็นโรคติดเชื้อไวรัส จากสัตว์สู่คน (Zoonosis) จัดเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังไม่มีทางเยียวยารักษา ผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการแสดงมักจะมีเสียชีวิตภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน และในป็นหนึ่ง ๆ จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้พอสมควร (แต่ในระยะหลัง ๆ นี้ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตลดลงเหลือปีละไม่ถึง 10 ราย) ซึ่งผู้ป่วยมักมีประวัติถูกสุนัขกัดแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดใหม่ ๆ

เชื้อไวรัสเรบีส




1.

ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดหรือข่วน โดยเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรค จะเข้าสู่บาดแผลที่ถูกกัด

2.

ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย ปกติจะไม่ติดเชื้อ นอกจากว่าบริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผล หรือรอยถลอก ชีดข่วน รวมทั้งการถูกเลียที่ริมฝีปาก หรือนัยน์ตา



1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วทาแผลด้วยน้ำยาฟิวิดิน (เบตาดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือทิเจลอร์ ไอโอดีน แล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที



2. ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจ ถ้าหากสุนัขไม่ตายให้ขังไว้ดูอาการ 10 วัน ขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการรักษาทางสมุนไพรหรือแพทย์แผนโบราณไม่สามารถป้องกันโรคได้ ไม่ควรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน



3. ในกรณีติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป หรือจำสัตว์ที่กัดไม่ได้ จำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน



4. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนหรือมีเลือดไหล แผลถลอกหรือแผลลึก รวมทั้งผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวหนังที่มีแผลถลอก ส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรือเพียงแต่อุ้มสุนัขไม่สามารถจะติดโรคได้